

# Neuzüchtungen Miely 2009



**Wotan**

Rot, mit geschlitzten Blättern,  
frühe Blüte



**Donner**

Rosa, mit gelber Mitte  
mittlere Blütezeit



**Froh**

Lilarosa mit oranger Mitte,  
niederer als Loge,  
mittlere Blütezeit



**Loge**

Lilarosa mit oranger Mitte  
mittlere Blütezeit



**Fasolt**

Rosa mit gelben Staubfäden,  
mittlere Blütezeit



**Fafner**

Rosa mit gelben Staubfäden,  
mittlere Blütezeit



**Alberich**

kräftiges Rot mit  
Flammenmitte  
mittlere Blütezeit



**Mime**

Weiß, im Aufblühen zartrosa,  
sehr standfest !  
sehr frühe Blütezeit



**Fricka**

Rosa mit zarten weißen  
Adern  
frühe Blütezeit



**Freia**

Weiß mit gelber Mitte  
späte Blütezeit



**Erda**

Weiß, im Aufblühen zartgelb,  
sehr standfest,  
sehr frühe Blütezeit



**Sigmund**

klares Rot, schönes Laub,  
frühe Blütezeit



**Sieglinde**

Rosa mit zarten weißen  
Adern,  
frühe Blütezeit



**Siegfried**

Dunkles Rot, Austrieb und  
Stengel der Pflanze ebenso,  
mittlere Blütezeit



**Brünnhilde**

Rosa, sehr standfest,  
niedere Pflanze,  
frühe Blütezeit



Siegfried im Austrieb

## Die Züchtungsarbeit einer neuen Pfingstrosensorte:

Nachdem die Pflanze das erste Mal geblüht hat, beginnt die Vermehrung der auserwählten neuen Sorten, dieses nimmt noch einmal 5-7 Jahre in Anspruch.



Samenkorn im  
September



Jungpflanze  
18 Monate alt



Jungpflanze  
24 Monate alt



Jungpflanze am  
Feld 4 Jahre alt



Die erste Blüte  
nach 6-7 Jahre